

چه مواردی را قبل و بعد از برونکوسکوپی رعایت کنیم؟

(ویژه بیماران)

برونکوسکوپی چیست ؟

برونکوسکوپی اقدام تشخیصی و گاهی درمانی است.

لوله نرم و قابل انعطاف دستگاه برونکوسکوپ از بینی یا دهان وارد راه های هوایی شده و از طریق آن پزشک قادر به مشاهده مستقیم داخل مجاری هوایی می باشد.

برونکوسکوپی هنگامی انجام می شود که پزشک از طریق شرح حال، تاریخچه بیماری، عکس قفسه و سی تی اسکن نتواند تشخیص قطعی جهت نوع بیماری بدهد. و احتیاج به نمونه برداری از داخل ریه داشته باشد.

موارد زیر را قبل انجام برونکوسکوپی رعایت فرمایید:

قبل از انجام برونکوسکوپی در درمانگاه ضرورت آن شرح داده شده و با موافقت بیمار انجام میشود.

داشتن یک نفر همراه الزامی است.

لاک ناخن خود را پاک کنید.

شب قبل از برونکوسکوپی بهتر است آقایان صورت خود را اصلاح کنند.

از ۴ ساعت قبل از انجام برونکوسکوپی باید ناشتا باشید، در صورت داشتن قطعات فلزی و دندان مصنوعی ، لنزهای چشمی و زیور آلات ، آن ها را خارج کنید.

موارد زیر را در هنگام مراجعه به پزشک با پرستار اطلاع دهید:

- اگر تا ۶ هفته قبل سابقه (MI) سکته قلبی داشته اید.
- اگر تنگی نفس شدید و یا اختلال انعقادی دارید .
- اگر سابقه حساسیت به تخم مرغ، سویا و لیدوکائین یا هر گونه حساسیت دارویی دارید.
- اگر قبلا طی عمل جراحی طحال شما برداشته شده است.
- اگر دریچه مصنوعی قلب و یا سابقه آندوکاردیت دارید .
- در صورتی که داروی خاصی مانند داروی ضد انعقاد (وارفارین و...) داروهای قلبی، ضد فشار خون بالا ، آسپرین، کلودیگرل و داروی کاهش دهنده قند خون را مصرف میکنید.

داشتن مدارک زیر جهت انجام برونکوسکوپی در بیماران سرپایی الزامی است:

نامه معرفی پزشک متخصص ریه جهت انجام برونکوسکوپی

عکس قفسه سینه و سی تی اسکن

برای خانم و آقایون بالای ۶۰ سال داشتن نوار قلب الزامی است

گاهی تست کرونا نوع سریع لازم است.

اقدامات زیر در حین برونکوسکوپی برای شما انجام میشود:

قبل از انجام برونکو برای شما یک رگ جهت تزریق دارو گرفته میشود.

داروی بی حسی موضعی به صورت اسپری در دهان شما استفاده میشود.

در حین برونکو باید از طریق بینی و یا از راه دهان نفس بکشید.

اکسیژن از طریق سوند بینی برای شما گذاشته میشود.

از دستگاهی به نام پالس اکسی متر جهت اندازه گیری میزان اکسیژن اشباع شده خون شریانی استفاده می شود که به صورت گیره به نوک انگشت متصل شده و داخل آن یک منبع توری است.

موارد زیر را بعد از انجام برونکوسکوپی رعایت کنید :

بهتر است یک ساعت بعد از برونکوسکوپی برای شروع خوردن از آب و مایعات استفاده کنید .

بروز گرفتگی صدا ،زخم گلو ورگه های خونی در خلط معمولی است.

بیماران سرپایی به مدت نیم ساعت در بخش برونکوسکوپی تحت نظر می باشند.

ندرتا در صورت بروز هر یک از نشانه های زیر بعد از برونکوسکوپی به پزشک مراجعه کنید:

خونریزی به صورت خلط خونی شدید با علائم بی قراری کاهش فشار خون ،افزایش ضربان قلب و درد قفسه سینه ، بی قراری ،کبود شدگی ،سیاه شدن نوک انگشتان و لب ها ،تنگی نفس ،عدم آگاهی و نامنظم شدن ضربان قلب، عدم توانایی در بلع احتمال گرفتگی حنجره با علامت خشن شدن صدا.